

Vaccinazione antipertosse alle donne in gravidanza

Pubblicato: Giovedì 27 Settembre 2018



A partire dal **1° ottobre l'Asst Lariana** offrirà alle donne in gravidanza, nel corso del **3° trimestre di gestazione**, la possibilità di vaccinarsi contro la **pertosse**. Il vaccino viene offerto **gratuitamente** alle iscritte al Servizio Sanitario Nazionale e residenti in Lombardia.

Ecco le modalità di **prenotazione**:

– Invio della richiesta, da parte dell'interessata, all'indirizzo mail vaccinazioni.gravide@asst-lariana.it indicando generalità, luogo di residenza, numero di telefono e indirizzo mail e settimana di gestazione.

Il servizio vaccinale provvederà a comunicare, via mail o telefonicamente, la sede (Como – Cantù – Olgiate Comasco) e la data dell'appuntamento.

Qualora non si avesse la possibilità di inviare la richiesta tramite posta elettronica, per fissare l'appuntamento sarà possibile rivolgersi allo sportello del Servizio Vaccinazioni del **Poliambulatorio** di Via Napoleona 60 a Como il **lunedì e il mercoledì dalle 13.30 alle 15.30**.

– Per le donne che fanno riferimento al **Punto Nascita** dell'Ospedale Sant'Anna di Fermo della Battaglia, è stato istituito un **accesso dedicato** con prenotazione al numero **031 585 9315** (martedì – mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00) o al numero **031 585 9665** (lunedì e venerdì dalle 13.30 alle 14.30).

– Per le donne seguite dai **Consultori Familiari** dell'Asst Lariana, la prenotazione della vaccinazione sarà assicurata dagli operatori. Il Servizio Vaccinale provvederà a comunicare, via mail o telefonicamente, la sede (Como – Cantù – Olgiate Comasco) e la data dell'appuntamento.

La pertosse

La pertosse, quando contratta dal neonato nei primi mesi di vita, può presentarsi in una forma molto grave a causa di complicazioni come polmonite e convulsioni che in rari casi possono essere addirittura mortali. L'infezione spesso può essere trasmessa anche dalla madre e la protezione conferita dalla malattia contratta in precedenza o dalla vaccinazione effettuata molti anni prima è labile e incostante.

Il periodo raccomandato per eseguire tale vaccinazione, disponibile solo in forma trivalente antidifterite-tetano-pertosse, è intorno alla **28° settimana di gravidanza**, al fine di consentire alla gestante un'adeguata produzione di anticorpi e il conseguente passaggio transplacentare degli stessi: in tal modo il neonato viene protetto dalla pertosse nel periodo tra la nascita e la prima vaccinazione.

Il vaccino trivalente antidiftotetano-pertosse si è dimostrato sicuro per la donna gravida e per il feto. Inoltre, esso è consigliato a ogni gravidanza, anche se la donna è in regola con i richiami decennali o abbia già contratto in passato la pertosse.

L'importanza di tale vaccinazione, prevista dai Piani Nazionale e di Regione Lombardia per la Prevenzione Vaccinale, è stata confermata dalla circolare 7 agosto 2018 per la promozione della salute femminile in età fertile.

Per ulteriori informazioni: www.asst-lariana.it

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it