

Oltre 144 milioni di dosi somministrate e 140.000 eventi avversi: ultimo report di Aifa sui vaccini antiCovid

Pubblicato: Lunedì 6 Marzo 2023



Dopo due anni di studi e indagini, **l'Agencia del Farmaco ha pubblicato il 14esimo rapporto sulla sorveglianza dei vaccini anticovid 19.**

Dal 27 dicembre 2020 al 26 dicembre 2022, **in Italia le dosi somministrate sono state 144.354.770.** Le segnalazioni raccolte sono state **140.595 con un'incidenza di 97 ogni 100.000 dosi.** L'81,3% (n. 114.290) erano riferite a **eventi non gravi**, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari.

Il vaccino Pfizer è stato il più utilizzato nella campagna vaccinale in Italia (66,7%), seguito da Moderna (23,8%), AstraZenca (8,4%), Jansen (1,1%) e Novavax (0,03%).

Per **Pfizer** le segnalazioni sono state **93.179 sul totale delle 96.309.064 dosi somministrate** con un tasso di segnalazione di 97 ogni 100.000.

Per **Moderna** i casi avversi sono stati **21.310 sulle 34.320.448 dosi** con un tasso di 62 ogni 100.000

Per **Astrazeneca** (utilizzato solo nella prima parte della campagna vaccinale) i casi avversi sono stati **24.383 sui 12.172.625 vaccini eseguiti** con un'incidenza di 200 ogni 100.000.

Per **Jansen** i casi segnalati sono stati **1.778 su 1.508.984 dosi somministrate** con l'incidenza di 118 ogni 100.000.

In tutto, **le segnalazioni gravi sono state 26.305 pari al 18,7%** di quelle arrivate. Di queste **971 hanno avuto esito fatale ma solo per 29 casi è emersa la correlazione tra vaccino e decesso**. Nel dettaglio, **l'83,6%** (812/971) delle segnalazioni con esito decesso presenta una valutazione del nesso di causalità con l'algoritmo dell'OMS, in base alla quale **il 59,4% dei casi (482/812) è non correlabile, il 28,0% (227/812) indeterminato e il 9,1% (74/812) inclassificabile per mancanza di informazioni sufficienti**.

I 29 casi correlabili alla vaccinazione anti-COVID-19 sono riferiti a **donne in 15 casi e a uomini in 14 casi**, con un'età media di 66,7 anni, mediana 76 anni. Il vaccino Pfizer è indicato come farmaco sospetto in 13 casi, il vaccino Moderna in 4 casi, il vaccino Astrazeneca in 11 casi e il vaccino Jansen in 1 caso.

Non si osservano variazioni significative nell'andamento delle segnalazioni relative alla fascia pediatrica (5-16 anni).

Data la situazione di convivenza con la malattia da SARS-CoV-2 anche l'Agenzia adotta l'approccio delle varie Agenzie regolatorie a livello europeo facendo confluire, in futuro, i risultati della vigilanza i Rapporti sulla sorveglianza di tutti i vaccini.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it